

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning där man tittar på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen. Även vävnadsprover (biopsier) kan tas för mikroskopisk undersökning.

Gastroskopet är en böjlig slang med en diameter på cirka 1cm. Längst fram på gastroskopet finns en lins med belysning och en kamera.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen ligger du på vänster sida. Undersökningen kan även utföras sittande. En bitring placeras i munnen för att skydda tänderna samt instrumentet. Gastroskopet förs in via munnen. Varken instrumentet eller den bedövningsspray du får i samband med undersökningen, påverkar dina andningsvägar. Du kan andas som vanligt hela tiden. Rapning under och efter undersökningen är vanligt förekommande, då man under undersökningen blåser in luft genom gastroskopet. Lugn andningsteknik och motivation underlättar undersökningen.

Hela undersökningen inklusive förberedelser brukar vanligtvis ta cirka 30 minuter.

Förberedelser inför undersökningen

För att kunna utföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller dricka 6 timmar innan undersökningen. Undvik även att röka eller snusa 6 timmar innan undersökningen.

Du får bedövningsspray, Xylocain utan adrenalin, i svalget för att minska svalgreflexerna. Avslappnande medel i tablettform kan vid behov ges 1 timme före undersökningen. Om du önskar detta måste du komma 1 timme tidigare till kliniken. Detta läkemedel påverkar reaktionsförmågan, så lämna därför bilen hemma!

Efter undersökningen

Om du fått bedövningsspray i svalget ska du inte äta eller dricka på ytterligare en timme efter undersökningen, då det finns risk att du sväljer fel.

Efter undersökningen får du muntlig information av utförande läkare. Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare. Om biopsier tagits får du samt din ordinarie läkare svar på dessa vanligtvis inom 4 veckor.

OBS!

Om du använder mediciner för hjärta, lungor, blodtryck, diabetes eller epilepsi ska dessa tas som vanligt, dock inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen. Om du tar blodförtunnande medicin, gäller ej Trombyl, vänligen kontakta oss. Kontakta oss även vid eventuella andra frågor.

Med vänlig hälsning
Sergelkliniken