

Patientinformation om vävnadsprovtagning från prostata via mellangården (området mellan pungen och anus).

Före undersökningen behöver vi få veta om du medicinerar med

Blodförtunnande medel: Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Waran eller Xarelto

Medel mot inflammation: Ex. Brufen, Diklofenak, Ibumetin, Ipren, Orudis, Voltaren, Zon.

Acetylsalicylsyra: Albyl, Aspirin, Bamy, Dispril, Magnecyl, Treo eller Trombyl.

Eventuella sjukdomar

Om du har medfött hjärtfel, hjärtklaffprotes, tidigare bakteriell infektion i hjärtklaffarna, diabetes, kortisonbehandling, upprepade urinvägsinfektioner eller allergi mot antibiotika eller bedövningsmedel behöver vi få veta det i förväg.

Före besöket

Under tre dygn före bör du undvika gasbildande mat som kål, lök, paprika, baljväxter och fullkorn.

Under besöket

Du får lägga dig i en urologisk stol med benen i högläge. Läkaren känner på prostata, tvättar och bedövar mellangården/underlivet. För in en ultraljudsstav i ändtarmen och doktorn ser då var proverna skall tas. Oftast har vi då också vägledning av magnetröntgenbilderna.

Undersökningen kan ta upp till 60 minuter men går i regel fortare.

Efter besöket

Risken för komplikationer är mycket liten. Synligt blod i sädesvätskan och urinen kan förekomma. Det är ofarligt och försvinner efter någon vecka.

Om du skulle få feber mer än 38,5°, frossa, frysningar, kraftig blödning eller urinstopp bör du omedelbart bege dig till en akutmottagning på ett sjukhus där du kan bli omhändertagen akut.

Sergelkliniken

Tfn: 08-644 28 55

Fax: 08-10 63 22

Karlavägen 112, 115 26 Stockholm

info@sergelkliniken.com